



Buletine de avertizare - fitosanitare ANF

Publicat la: 11 martie 2025



Buletine de avertizare - **fitosanitare** ANF

PRIMĂRIA COMUNEI BUHOCI

JUDEȚUL BACĂU

Nr. 1557

din 16.08.2025

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 2 din 16.08.2025

Condițiile climatice în spații deschise / în spațiile protejate: sere ☐ solarii ☐ răsadnițe ☐ din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii :

GĂRGĂRIȚA TULPINILOR DE RAPIȚĂ (CEUTORHYNCHUS NAPI)

ȘI ALȚI DĂUNĂTORI (PURICI)

care poate cauza pierderi importante la: **CULTURA DE RAPIȚĂ**
Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:

PERIOADA DE ACTIVITATE A GĂRGĂRITEI TULPINILOR DE RAPIȚĂ ÎNCEPE CÂND TEMPERATURA SOLULUI LA 5 CM ESTE ÎN JURUL VALORII DE 6 °C, CÂND PLANTELE PORNESC ÎN VEGETAȚIE ȘI CONTINUĂ PÂNĂ LA SFÂRȘITUL ÎNMUGURITULUI.
LARVELE APĂRUTE PĂTRUND ÎN PEȚIOLI , TULPINI ȘI NU MAI POT FI COMBĂTUTE.

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

LA CONSTATAREA PRIMILOR ADULTI HIBERNANȚI PE PLANTE (CAPCANE)

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

KARATE ZEON (NINJA) = 0,15 L/HA sau

DELTA GRI (FASTER DELTA) = 0,3 L/HA

Alte recomandări:

*** AMPLASAREA DE CAPCANE GALBENE LICPICIOASE PENTRU MONITORIZAREA**

GĂRGĂRIȚELOR HIBERNANTE

*** PENTRU PHOMA LINGAM SE POATE UTILIZA PRODUSUL AMISTAR GOLD (PRIORI GOLD) = 1 L/HA**

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate cu acțiune similară.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.


Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** www.aiprom.ro

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 4 din 6 MARTIE 2025



Condițiile climatice în spații deschise / în spațiile protejate: sere ☐ solarii ☐ răsadnițe, din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii :

GĂRGĂRIȚA FLORILOR DE MĂR (ANTHONOMUS POMORUM) +

FĂINARE (PODOPHAERA LEUCOTRICA)

care poate cauza pierderi importante la: **MĂR, PĂR**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:

GĂRGĂRIȚA FLORILOR DE MĂR: ADULTUL ARE 5-6 mm LUNGIME ȘI ESTE BRUN-ROȘCAT. ATACĂ MUGURII ȘI FLORILE.

FĂINAREA : APARIȚIA UNEI PĂSLI MICELIENE ALBICIOSE -GĂLBUI PE SUPRAFAȚA RAMURILOR

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

LA CONSTATAREA A 6 GĂRGĂRIȚE / POM LA SCUTURARE

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

POLECI (DECA 5,5 EC) = 0,05% + THIOVIT JET 80 WG = 5-8 KG/HA

Perioada optimă de tratament:

CÂND 10-15 % DIN MUGURII FLORALI SE AFLĂ ÎN FAZA DE DEZMUGURIT

Alte recomandări:

TRATAMENTUL SE VA TERMINA ÎN 4-5 ZILE ȘI SE PRELUNGEȘTE CU NUMĂRUL DE ZILE

NEFAVORABILE STROPIRII (PLOI, VÂNT) .

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate cu acțiune similară.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !


Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 - 8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** www.aiprom.ro

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de

www.anfd.ro



BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 5 din 6 MARTIE 2025

Condițiile climatice în spații deschise / în spațiile protejate: sere ☐ solarii ☐ răsadnițe ☐ din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii:

PONTĂ ECLOZATĂ: PĂDUCHI, ACARIENI, DEFOLIATORI, MONILIOZĂ

care poate cauza pierderi importante la: PRUN, CIREȘ ȘI VIȘIN

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:

PADUCHI: FEMELA - NEARIPATĂ, DE CULOARE BRUN-ROȘCATĂ SAU BRUN - GĂLBUIE.
PRIMĂVARA LARVELE HIBERNANTE MIGREAZĂ PE TULPINĂ, RAMURI FORMÂND
COLONII

MONILIOZA: SE MANIFESTĂ PRIN BRUNIFICAREA ZONEI AFECTATE

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

FAZA DE BUTON VERDE PÂNĂ LA ÎNCEPUTUL ÎNFLORITULUI

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz:

DELTA GRI / (FASTER DELTA) - 0,3 L/HA +
NISSORUN 10WP - 0,3 KG/HA +
ALCUPRAL 50 PU - 0,2% sau VITRA 50WP (CUPRIDIN) - 1,5-2 KG/HA

Alte recomandări:

* TEMPERATURI MAI MARI DE 6 °C

* VITEZA VÂNTULUI SUB 6 KM/ORĂ

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate cu acțiune similară.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare!


Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 - 8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** www.aiprom.ro

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale -

www.anfd.ro



BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 6 din 6 MARTIE 2025

Condițiile climatice în spații deschise / în spațiile protejate: sere ☐ solarii ☐ răsadnițe ☐ din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii :

PADUCHELE VERDE AL CEREALELOR (SCHIZAPHIS GRAMINUM), PADUCHELE CENUSIU (RHOPALOSIPHUM PADI), MUSTELE CEREALELOR , BOLI FOLIARE (făinare, pătarea reticulară, septorioza, fusarioza, alternarioza)

care poate cauza pierderi importante la: **CEREALE PAIOASE: GRAU, ORZ**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:

AFIDELE : CÂND SE HRĂNESC, ÎNȚEAPĂ ȘI ABSORB SUCUL CELULAR, PLANTELE ÎȘI ÎNCETEAZĂ CREȘTEREA, ZONELE ATACATE PREZENTÂND PETE GALBENE SAU ROȘII CA REACȚIE A TOXINELOR PRODUSE DE AFIDE, ACESTEA ULTERIOR OFILINDU-SE;
- AU UN IMPACT INDIRECT ÎNTRUCÂT POT TRANSMITE VIRUSURI CE PRODUC ÎNGĂLBENIREA ȘI PITICIREA CEREALELOR.

MUSTELE CEREALELOR: IERNEAZĂ LA LOCUL DE HRĂNIRE: O PARTE CA PUPE, O PARTE CA LARVE. LARVELE MUSTELOR CEREALELOR ATACĂ PLANTELE TINERE, DISTRUGÂND MUGURELE DE CREȘTERE AL TULPINII ȘI FRUNZA CENTRALĂ CARE SE DETAȘEAZĂ UȘOR PRIN TRAGERE. FRUNZA CENTRALĂ SE ÎNGĂLBENEȘTE ȘI SE USUCĂ.

FĂINAREA (ERYSIPIE GRAMINIS): PĂRȚILE AERIENE SUNT ACOPERITE DE O PĂSLĂ ALBICIOASĂ.

PĂTAREA RETICULATĂ (PYRENOPHORA TERES) - PE FRUNZE, CA URMARE A ATACULUI, APAR PETE DE CULOARE MARO PÂNĂ LA MARO ÎNCHIS, DE FORMĂ RETICULATĂ.

SEPTORIOZA (SEPTORIA TRITICI) - PETE OVALE GALBEN-VERZUI PE LIMBUL FOLIAR, ÎN TIMP DEVIN BRUNE, CU FORME NEREGULATE, DELIMITATE DE NERVURI.

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

LA CONSTATAREA DĂUNĂTORILOR

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :
LAMDEX EXTRA (REXARIS 25 WG) = 0,3 KG /HA +
AMISTAR / (MIRADOR 250 SC) = 0,75-1,0 L / HA

Alte recomandări:

*** TRATAMENTUL SE POATE EXECUTA ODATA CU ERBICIDAREA**

*** VITEZA VÂNTULUI SUB 6 KM/ORĂ**

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate cu acțiune similară.

www.anfdf.ro