

Informare ANF - boală care afectează vița de vie

Publicat la: 9 septembrie 2025



Autoritatea Națională Fitosanitară aduce la cunoștință faptul că **Flavescența aurie**, o boală extrem de gravă care afectează vița de vie, reprezintă o amenințare serioasă pentru culturile viticole din regiunea noastră.

Nr. intrare

Nr. ieșire 1370/05.09.2025.

PRIMĂRIA COMUNEI BUHOCI

JUDEȚUL BACĂU

Nr. 6273

din 08.08.2025

INFORMARE:

Gravitatea Flavescenței Aurii - *Grapevine flavescence dorée phytoplasma*

Stimați Fermieri,

Vă aducem la cunoștință că **Flavescența aurie**, o boală extrem de gravă care afectează vița de vie, reprezintă o amenințare serioasă pentru culturile viticole din regiunea noastră. Este esențial să fiți informați și să luați măsurile necesare pentru a proteja viile și pentru a preveni răspândirea acestei boli.

Ce este Flavescența Aurie?

Flavescența aurie este o fitoplasmoză cauzată de fitoplasme, microorganisme patogene similare bacteriilor, dar fără perete celular.

Aceste fitoplasme sunt transmise în principal de cicada *Scaphoideus titanus*, un vector foarte eficient.



Simptome

Semnele infecției cu flavescența aurie includ:

- Îngălbenirea sau înroșirea frunzelor (în funcție de soiul de viță de vie);
- Frunzele au marginile răsucite către partea inferioară și devin casante;
- Lipsa lignificării lăstarilor;
- Struguri care nu ajung la maturitate și/sau se stafidesc.



IMPACTUL ECONOMIC ȘI ECOLOGIC

Boala poate avea consecințe devastatoare asupra producției de struguri și vin, conducând la:

- Reducerea semnificativă a randamentului culturilor;
- Costuri suplimentare pentru tratamente și măsuri de control;
- Necesitatea eradicării plantelor infectate, ceea ce implică pierderi financiare majore și timp pentru replantare.


MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL

Pentru a preveni și controla răspândirea flavescenței aurii, vă recomandăm următoarele acțiuni:

- **Monitorizare Continuă:**
 - Inspectați regulat viile pentru simptomele bolii și pentru prezența cicadelor mai ales prin instalarea capcanelor galbene lipicioase.
- **Tratament Insecticid:**
 - Aplicați tratamente insecticide specifice cu produse de protecție a plantelor omologate pentru controlul **vectorului *Scaphoideus titanus***.
- **Eradicarea Plantelor Infectate:**
 - Îndepărtați și distrugeți imediat plantele care prezintă simptome de flavescență aurie pentru a preveni răspândirea.
- **Plante Sănătoase:**
 - Utilizați material săditor certificat și sănătos pentru replantare.
- **Consultare:**
 - Colaborați cu Autoritatea Națională Fitosanitară pentru implementarea măsurilor adecvate și pentru informare continuă.

Informații suplimentare:

https://www.anfdf.ro/sanatate/program/fito/Programe_de_monitorizare/program_grapevine.pdf



*Datele calendaristice sunt cu titlu orientativ și pot varia în funcție de condițiile climatice

T1 - POLECI
T2 - POLECI
T3 - EXIREL

Concluzie

Flavescența aurie este o problemă serioasă care necesită atenție și acțiune promptă. Informarea și colaborarea dintre fermieri și autorități sunt esențiale pentru a menține sănătatea viilor și pentru a asigura o producție viticolă de calitate.

Vă încurajăm să rămâneți vigilenți și să urmați recomandările inspectorilor fitosanitari pentru a proteja vița de vie și a preveni răspândirea acestei boli devastatoare.

Cu stimă,

Coordonator OFZ Bacău -Neamț,

Gheorghe ZAHARIA

www.anfdf.ro



BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 57 din 05 SEPTEMBRIE 2025

Condițiile climatice în spații deschise / în spațiile protejate: sere ☐ solarii ☐ răsadnițe ☐ din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii :

PĂDUCHELE DIN SAN JOSE,
RAPĂN (VENTURIA INEQUALIS),
FĂINARE (PODOSPHAERA LEUCOTRICHIA),
BOLI DE DEPOZIT (GLOEOSPORIUM SP. , ALTERNARIA SP. , PENICILLIUM SP. , BOTRITIS SP.)

care poate cauza pierderi importante la: **MĂR, PĂR**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:

PĂDUCHELE DIN SAN JOSE: ZONELE AFECTATE DE PĂDUCHE SE ÎNROȘESC ȘI SE NECROZEAZĂ DIN CAUZA UNEI SUBSTANȚE TOXICE PE CARE PADUCHELE O INJECTEAZĂ ÎN TIMP CE SE HRĂNEȘTE.

RAPĂNUL MĂRULUI : AFECTEAZĂ TOATE ORGANELE VERZI ALE PLANTEI. ATACUL SE MANIFESTĂ LA ÎNCEPUT PRIN APARIȚIA UNOR PETE MICI, CU ASPECT CATIFELAT CU DIMENSIUNI DE 0,5-6 MM DE CULOARE VERDE -MASLINIE, SAU BRUN- NEGRICIOASĂ CU UN CONTUR DIFUZ. LA ATACURI PUTERNICE PETELE POT SA CONFLUEZE

FĂINAREA : ATACĂ FRUNZELE, LĂSTARI TINERI, RAMURILE, FLORILE, MAI RAR FRUCTELE. SE MANIFESTA PRIN APARIȚIA UNEI PĂSLE MICELIENE ALBICIOSE - GĂLBUI.

BOLI DE DEPOZIT: PETE CIRCULARE, DIFERITE MĂRIMI, DE CULOARE BRUNĂ, CE SE MĂRESC PE MĂSURĂ CE BOALA AVANSEAZĂ. PULPA FRUCTULUI DIN ZONA AFECTATĂ SE ÎNMOAIE ȘI PUTREZEȘTE.

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

PREVENIREA APARIȚIEI AGENȚILOR FITOPATOGENI

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

POLECI (DECA 2,5 EC) - 0,05-0,075 % + BELLIS - 0,8 KG/ HA

Alte recomandări:

PENTRU ACARIENI SE POATE UTILIZA PRODUSUL NISSORUN 10 WP - 0,3 KG / HA

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru teste avertizate cu acțiune similară.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.